

Cercetări asupra faunei de lepidoptere (insecte) în zona de nord și vest a Olteniei

ION I. FIRU

IOAN M. STĂNOIU

În ultimii ani, autorii au efectuat intense cercetări asupra insectelor și în special a lepidopterelor din Nordul și Vestul Olteniei. Cu această ocazie, a fost recoltat material din Călimănești, Ocnele Mari, muntele Cozia, Cărbunești, Preajba, Cheile Oltețului, Novaci, Masivul Parâng (valea Vacii, valea Gilortului, Rîncă și vîrful Păpușa), valea Sohodolului, Tismana, Baia de Aramă, Ponoare și Orșova. Rezultatele cercetărilor au fost parțial publicate în perioada 1965—1972.

În prezenta lucrare sînt semnalate 65 de specii de lepidoptere, dintre care 35 de specii sînt noi pentru entomofauna Olteniei. Unele specii ca: *Micropteryx myrtetella* Z., *Schiffermulleria stroemella* F., *Lampronia luzella* Hb., *L. rubiella* Bjerk, *Allophyes bimaculosa* L. și altele sunt rare pentru fauna României.

Prezentăm, în continuare, catalogul speciilor recoltate.

Familia Micropterygidae

1. *Micropteryx myrtetella* Z.* un M și F recoltați la 20. VI. 1967 în valea Vacii din Parâng și valea Lotrului (Voineasa) la 10. VII. 1969.

Fluturii cu anvergură de 4—5 mm zboară în număr mare prin locurile umede, de-a lungul pîraielor, așezîndu-se pe plantele de *Impatiens noli* — tangere L. Specia a fost semnalată o singură dată de Rebel la Băile Herculane. Este răspîndită în Europa centrală.

Familia Incurvariidae

2. *Nematopogon panzerella* Hbn.* un M, Rîncă — Parâng la 30. VII. 1970. Specia zboară prin boschetele de *Vaccinium myrtillus* L.

3. *Lampronia luzella* Hb.*; 4 M colectați pe vîrful Păpușa — Parâng la 30. VII. 1970. Fluturele se adăpostește ziua în tufele de *Rhodo-*

* Speciile asterate sunt noi pentru fauna Olteniei.

dendron L. și zboară seara ajungind pînă în păsunile de la poalele muntelui.

4. *L. rubiella* Bjerk*; 3 M colectați pe pantele cu Rhododendron L. ale vîrfului Păpușa — Parîng la 30. VII. 1970.

Familia Adelidae

5. *Nemtois metallicus* P.; numeroși M și F colectați în fînețele din Horezu și valea Latoriței la 14.VII.1971. Fluturii se hrănesc intens ziua pe inflorescențele de *Knautia arvensis* L. Fiind deranjați, tîșnesc în zbor la înălțimi mari.

6. *N. pfeiferellus* Hb.; 3 M colectați în apropierea gării Copăcioasa la 1. VIII. 1970. Fluturii se întîlnesc pretutindeni pe arbuștii de *Prunus spinosa* L.

7. *Adela gedeerella* L.; 2 M colectați în timpul zilei la poalele muntelui Piatra Cloșani, pe tufe de *Quercus* sp. la. 18. VI. 71.

8. *A. viridella* Sc.; 2 M și 1 F în pădurea Cărbunești la 11.V. 1972 zburînd în semiobscuritatea tufelor. Specia a fost colectată și în pădurea Cernele — Craiova la 23. IV. 1972. Este citată la Timișoara, Cluj.

9. *A. leucocerella* Sc.*; numeroși M și F colectați la Stațiunea experimentală Preajba la 11. V. 1972. Fluturii se hrănesc pe inflorescențe de Crucifere numai cînd lumina soarelui este puternică și chiar dacă bate vînt puternic. Se ascund pe dosul frunzelor la cea mai ușoară înourare.

11. *Nemophora swammerdamella* I.; 2 M în pădurea Novaci la 14. VI. 1970 în lumișuri. Specia a fost semnalată și în împrejurimile Craiovei.

Familia Tineidae

12. *Nemapogon granellus* L.; numeroși M și F colectate în cabana silvică Poiana Plaiului din munții Latoriței la 18. VII. 1971.

13. *N. arcellus* F.*; 2 M colectate în cabana Poiana Plaiului — Latorița la 18. VII. 1971.

14. *N. personellus* P. et M. numeroși M și F în cabana silvică Poiana Plaiului — Latorița la 19. VII. 1971. Specia a fost semnalată și în împrejurimile Craiovei.

15. *N. cloacellus* Hw.; 3 M colectați în cabana Poiana Plaiului — Latorița la 19. VII. 1971. Larva se dezvoltă în ciuperca *Merulius lacrimans*.

16. *Haplotinea ditella* P. et Diak.; 2 M în cabana Poiana Plaiului — Latorița, la 19. VII. 1971. Ca și la specia precedentă, larva se dezvoltă în ciuperca *Merulius lacrimans*.

17. *H. insectella* F*; 1 M în cabana silvică Poiana Plaiului — Latorita la 18. VII. 1971.

Familia Argyrestiidae

18. *Argfrestia nitidella* F.; numerosi M în pădure și livezi de pruni la Novaci la 18. VI. 1970. Fluturii zboară seara în coroana prunilor, iar ziua se ascund pe dosul frunzelor.

Familia Gelechiidae

19. *Atramaea leuchoptera* Stgr*; 4 M în cabana Poiana Plaiului — Latorita la 19. VII. 1971.

Familia Oecophoridae

20. *Oecophora staintoniella* Z.; numerosi M și F colectați în pădurea Cărbunești la 11. V. 1972. A fost semnalată pentru Oltenia la Călimănești — Vîlcea și Stîngăceaua — Mehedinți. Fluturii zboară pe puieții de *Quercus*.

21. *Schiffermulleria similella* Hb.; numerosi M și F la 18.VII. 1971, în cabana Poiana Plaiului — Latorita. Larva se dezvoltă împreună cu larvele a numeroase Tineidae în ciuperca *Merulius lacrimans* care a invadat cabana.

22. Sch. stroemella F.*; 3 F la 18.VII.1971 în cabana silvică Poiana Plaiului — Latorita. Larva se dezvoltă în aceeași ciupercă cu specia precedentă. A fost semnalată în munții Cibinului și de Rebel la Hâlle Herculane.

Familia Alucitidae

23. *Orneocs crepusculella* Z. et E.*; 1 M la Călimănești colectat seara, la lumină artificială la 15. VI. 1972.

Familia Cochlididae

24. *Cochlidon limacodes* Hufn.* 1 F la Horezu la 2.VII.1970. Fluturele zboară în ierburile de la marginea pădurii.

Familia Zygaenidae

25. *Procris statices* L.; numerosi M și F colectați în finețele din munții Latoriței la 16. VII. 1971. Fluturele se hrănește pe inflorescențe de *Knautia arvensis* L.

26. *Zygaena carniolica* L.*; 1 M Călimănești la 10.V.1968 în fînețe.

27. *Zygaena ephialtes* f. *medusa* Pall.*; 1 M Călimănești la 18.VII. 1968 prin fînețe.

Familia Crambidae

28. *Catoptria pinella* L*; numeroși M și F colectați în stațiunea Rîncă — Parîng la 30. VII. 1970.

Familia Geometridae

29. *Brephos parthenias* L*; 1 M Călimănești la 20.IV.1970, zburînd ziua.

30. *Cidaria truncata* Hufn.; 1 M Cheile Oltețului la 10.VII.1971.

31. *Calospilos sylvata* Scop.* 1 M zburînd la 20.VI.1967 prin făgetul de pe valea Vacii — Parîng.

32. *Alsophila aescularia* Scop.; 1 M colectat seara la lumină artificială la Călimănești la 10. IV. 1970.

33. *Apocheima hispidaria* Den. et. Schiff.; 2 M Călimănești la 10. IV. 1970. Specia a fost semnalată și în împrejurimile Craiovei.

34. *Lycia hirtaria* Cl.; 1 M la Călimănești la 15.IV.1970.

35. *Biston strataria* Hfn.; 2 M la Călimănești la 12.IV.1970.

Specia este răspîndită în toată Oltenia.

Familia Notodontidae

36. *Drymonia querna* F* 1 M la Călimănești la 15. VII. 1970. Rar întîlnită în Oltenia.

37. *Odontosia carmelita* Esp.* 1 M la Călimănești la 22.IV.1970.

38. *Laphopteryx capucina* L.*; 1 M la Călimănești la 1.VII.1971. Zboară în exemplare izolate în zona montană a Olteniei.

39. *Ptilophora plumigera* Esp.*; 1 M la Călimănești la 18.XI.1972. Specia este răspîndită în toată Oltenia, fiind și la Craiova și Fînt nele (leg. D. Pîrvescu).

40. *Thaumatopoea procesionea* L.; 1 M la Călimănești la 1.VII. 1971. Este o specie care uneori produce pagube importante în păduri.

Familia Lymantriidae

41. *Dasychira pudibunda* L.*; 1 M colectat pe valea Lupsei — Baia de Aramă, la 15. V. 1970.

42. *Lymantria monacha* L.; 2 M colectați în Cheile Oltețului la 15. VII. 1971. A fost semnalată și în masivul Parîng, la Rîncă.

Familia Noctuidae

43. *Mesogona acetosellae* Den. et Schiff. 2 M la Călimănești la 10.IV.1970.
44. *Orthosia incerta* Hufn.; 2 M la Călimănești la 15.IV.1970. Specie dăunătoare răspândită și în împrejurimile Craiovei.
45. *Lithophane ornithopus* Hfn.* 2 M și 4 F. Colectați la 16.IV. 1970 la Călimănești.
46. *Allophyes bimaculosa* L.*; 1 M la Călimănești la 16.IV.1970.
47. *Griposia aprilina* L.; 1 M la Călimănești la 12.IV.1970. Este o specie rar întâlnită în R.S. România.
48. *Diloba coeruleocephala* L.; 3 M și 1 F la Călimănești la 20.X. 1971. Este răspândită în toată Oltenia.
49. *Agrotis venustula* Hb.*; 2 M la Călimănești la 12.VIII.1970.
50. *Euclidia deceptoria* Hb.*; 1 M colectat pe valea Vacii — Parîng, la 20. VI. 1967. Zboară printre fagii tineri.

Familia Arctiidae

51. *Pelosia muscerda* Hfn.* 2 M la Ocnele Mari, la 8.VIII.1964.
52. *P. obtusa* H.S.* 1 M la Orșova, la 24.IX.1968.
53. *Eilema deplana* Esp.; 3 M din Ocnele Mari, Călimănești și Orșova, între 17.VIII. — 24.IX.1968.
54. *E. complana* L.; numerosi M și F la Călimănești și Orșova între 13.VIII. — 24.X.1968.
55. *E. caniola* Hb.*; 3 M în ierburile de la Ponoare — Baia de Aramă la 5. V. 1968. Răspândită în zona montană a R.S. România.
56. *E. palliatella* Scop.*; 2 M la Călimănești la 11.VIII.66.
57. *E. lutarella* L.*; 2 M la Călimănești la 14.VIII.1966.
58. *E. pallifrons* Z.*; 1 M la Călimănești la 22.VIII.1967.
59. *Cybosia mesomella* L.*; 1 M în Cheile Sohodolului la 28.VI.1965.
60. *Setina irrorella* L.*; 3 M în ierburile de la Ponoare la 5.V. 1968.
61. *Endrosa roscida* Den. et Schiff.*; 1 M la Novaci la 28.V.1959. Comună în regiunea subcarpatică a R.S. România.
62. *Euprepia cribalaria pannonica* Daniel*; 2 M, la Călimănești la 22.VIII. 1957.
63. *Parasemia plantaginis carpathica* Daniel*; 3 M pe muntele Cozia la 2. VIII. 1967. A fost semnalată și în masivul Parîng.
64. *Arctinia caesarea* Göze,*; 1 F la Călimănești la 26.V.1971. Este o specie mai rară, colectată de Ostrogovici la Azuga, Cluj, Slănic.

Familia Attacidae

65. *Eudia spini* Den. et Schiff.; 1 F la Călimănești la 12.VI.1967.
Specia zboară și în imprejurimile Craiovei.

Concluzii:

În prezenta notă sunt semnalate 65 de specii de lepidoptere care aparțin la 17 familii. Dintre acestea 35 sunt citate pentru prima dată în Oltenia. Adăugate la cele 908 specii citate în lucrări anterioare, numărul total al lepidopterelor cunoscute din Oltenia se ridică la 942 specii și 12 aberații. Lucrarea semnalează unele specii dăunătoare cum sunt *Drymonia querna* F., *Dasychira pudibunda* L., *Lymantria monacha* L. care produc în unii ani importante pagube în păduri.

B I B L I O G R A F I E

1. Alexinschi A. și Peiu M. (1954). — Contribuții la cunoașterea lepidopterelor din Oltenia (com. Căciulătești și pădurea Roaba și Sadova, reg. Craiova). Bul. St. Acad. R.P.R. t. VI., 1, Iași.
2. Alexinschi A. și König Fr. (1963). — Contribuții la cunoașterea faunei de lepidoptere din munții Lotru și Parâng. — S.S.N.G. Comunic. zool. vol. II, Buc.
3. Bobîrnac B. (1966). — Contribuții la cunoașterea entomofaunei zonei subcarpatiche a Olteniei (I). Inst. Agr. Craiova, VIII.
4. Bobîrnac B. (1967) și Stănoiu I. — Contribuții la cunoașterea entomofaunei masivului Parâng (5) Bul. șt. Univ. Craiova, Nr. IX.
5. Bobîrnac B. (1971) și Stănoiu I. — Contribuții la cunoașterea entomofaunei din zona montană a Olteniei (III) — Studii și cercetări, Mon. Nat. Craiova.
6. Caragea A. (1903). — Bul. Soc. șt. 12 ; 5—6, București.
7. Czekelius D. (1917). — Verh. Mitt. Sieb. Vereinis, 47, Sibiu.
8. Popescu Gorj, A. (1964). — Catalogue de la colecție des lépidoptères prof. A. Ostrogovich — București.
9. Popescu Gorj, A. (1965). — Les microlépidoptères de la region de Suceava (R.S.R.). Trav. Mus. Gr. Antipa vol. V. — Buc.
10. Stănoiu I. (1965) și Firu I. — Contribuții la studiul Pyralididaelor. (Lepidoptera) din Oltenia. Rev. Muz. nr. spec. Buc.
11. Stănoiu I. (1965) și Bobîrnac B. — Contribuții la studiul lepidopterelor din Oltenia. (I). S.S.N.G. Com. Zool. vol. III, Buc.
12. Stănoiu I. (1967) și Bobîrnac B. — Ibidem (II), idem vol. V. Buc.
13. Stănoiu I. (1968) și Nemeș I. — Cercetări asupra faunei Carposinidae (Lepidoptera) în R.S.R. Rev. biol. seria zool. nr. 2 Buc.
14. Stănoiu, I. (1968) și Nemeș I. — Schiffermulleria bruandella Reg. (Oecophoridae — Lepidoptera) în fauna R.S.R., idem nr. 5 Buc.
15. Stănoiu, I. (1968). — Noi date asupra microlepidopterelor din Oltenia. Bul. șt. Univ. Craiova, nr. X.
16. Stănoiu, I. (1968) și Bobîrnac B. — Noi contribuții asupra macrolepidopterelor din Oltenia (III) Bul. șt. univ. Craiova, nr. X.
17. Contribuții la studiul Tortricidelor (Lepidoptera) din Oltenia. An. Univ. Cv. vol. II.
18. Stănoiu I. (1971). — Cercetări noi asupra faunei de microlepidoptere (Insecta) din Oltenia (VI) Studii și cercet. Subcom. mon. nat. Oltenia.
19. Stănoiu I. (1972). — Noi contribuții la studiul Tortricidelor din Oltenia (II), Stud. și cerc. ocrot. nat. Gorj.

Legendă : M = mascul

F = femelă.